

ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ХУМАНОГ ПАПИЛОМА ВИРУСА

За здравију будућност!

ШТА ЈЕ ХУМАНИ ПАПИЛОМА ВИРУС (ХПВ)?

- ▶ Хумани папилома вирус обухвата групу више од 100 типова вируса, од којих око 40 узрокује болести коже и слузнице аногениталне регије.
- ▶ Инфекција ХПВ-ом је веома честа и једна је од најчешћих сексуално преносивих инфекција.
- ▶ Већина инфекција изазваних ХПВ-ом пролази без симптома, односно већина заражених и не зна да има инфекцију.
- ▶ Трајна инфекција ХПВ-ом може да узрокује промјене за које постоји ризик од преласка у рак гениталне регије, рак грлића материце, роднице и стиднице код жена, карцином пениса, те карцином ректума и грла код мушкараца и жена, те брадавице аногениталног подручја код особа оба пола.

ЗАШТО ЈЕ ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ХПВ-а ВАЖНА?

- ▶ Рак грлића материце је четврти најчешћи рак међу женама, а најчешћи узрочник овог обољења је хумани папилома вирус.
- ▶ Број новообољелих и умрлих жена од рака грлића материце у Републици Српској је у сталном порасту.
- ▶ У Републици Српској на располагању је најсавременија деветовалентна вакцина.
- ▶ Рак грлића материце се може спријечити, те је превенција вакцинацијом против ХПВ-а веома важна.

КОМЕ ЈЕ ПРЕПОРУЧЕНА ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ХПВ-а?

- ▶ Препоручена и бесплатна вакцинација против ХПВ-а у Републици Српској се спроводи код дјевојчица и дјечака од 11 до 14 година живота.
- ▶ Вакцинација против ХПВ-а може се примијенити код особа узраста десет и више година.
- ▶ Вакцину против ХПВ-а може да прими и особа која је већ била изложена ХПВ-у, а у том случају вакцинацијом добија заштиту од инфекције оним типовима вируса којима особа није била изложена, односно дјелимичну заштиту.

ГДЈЕ СЕ ОБАВЉА ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ХПВ-а?

- ▶ Дјечаци и дјевојчице узраста од 11 до 14 година, за које је вакцинација против ХПВ-а препоручена и бесплатна, вакцинишу се у надлежном дому здравља.

- ▶ Вакцинација против ХПВ-а за особе које немају право на бесплатну вакцинацију, спроводи се у ЈЗУ Институту за јавно здравство Републике Српске и регионалним центрима Института за јавно здравство Републике Српске, а трошкове сноси корисник услуге.
- ▶ Више информација можете затражити од свог надлежног доктора медицине или Института за јавно здравство Републике Српске.

У КОЛИКО ДОЗА СЕ ПРИМЈЕЊУЈЕ ВАКЦИНА ПРОТИВ ХПВ-а?

- ▶ Вакцинација се проводи давањем двије дозе вакцине.
- ▶ Препручени размак између двије дозе вакцине је шест мјесеци до годину дана.

ДА ЛИ ЈЕ ВАКЦИНА ПРОТИВ ХПВ-а БЕЗБЈЕДНА?

- ▶ Од стране Глобалног савјетодавног одбора за вакцинацију, вакцина против ХПВ-а оцјењена је као високо безбједна.
- ▶ Као и код било које друге вакцинације, могу бити забиљежене нежељене реакције, као резултат имунолошког одговора организма.
- ▶ Најчешће нежељене реакције на вакцину против ХПВ-а су локалне реакције на мјесту примјене (бол, оток и црвенило), а могу се јавити и блаже опште тегобе (главобоља, мучнина, вртоглавица, благо повишена тјелесна температура или замор).

У КОЈИМ ЗЕМЉАМА У СВЈЕТУ СЕ ПРИМЈЕЊУЈЕ ВАКЦИНА ПРОТИВ ХПВ-а?

- ▶ Вакцина против обољења изазваних хуманим папилома вирусима је уведена у више од 100 земаља свијета, укључујући земље нашег региона.
- ▶ Вакцина против ХПВ-а у свијету је доступна више од 15 година, а у земљама у којима се примјењује биљежи се знатно смањење ХПВ инфекција и карцинома које ХПВ узрокује.



ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ



Министарство здравља и
социјалне заштите
Републике Српске